Analyse des trajectoires des communautés de macrofaune benthique : quels liens avec l'habitat et les trajectoires environnementales ?

Chirine Toumi,
Emmanuelle Cam, Olivier Gauthier et
Jacques Grall

cs de Maërl
 oiers Intertidaux
 tidal Meuble
 tidal Meuble

1 échantillonnage de macrofaune benthique par an au printemps

Nombre de sites pris en compte = 26

Nombre d'années prises en compte = 14

Erwan AMICE cnrs/Observatoire IUEM©

1 Site

3 Points

9 Réplicats

26 sites x 9 répliants x 14 années

Total = 979 taxons et + de 51 000 individus

Sites	Années
A	T0				
A	T1				
A	T2				
A	T3				
B	T0				
B	T1				
B	T2				
B	T3				
C	T1				
...	...				

Abondances

CTA (De Cáceres *et al.*, 2019)

Sites	Années
A	T0	Abondances			
A	T1				
A	T2				
A	T3				
B	T0				
B	T1				
B	T2				
B	T3				
C	T1				
...	...				

CTA (De Cáceres *et al.*, 2019)

CTA (De Cáceres *et al.*, 2019)

→ Différence de formes / taille / position →

Trajectoires

Le nombre d'observations est réduit au nombre de sites lorsqu'on s'intéresse aux trajectoires

Données environnementales

Données issues de modèles

T°C

Salinité

Courant

Données récoltées sur le terrain

Données granulométriques

Sites	Années
A	T0	Valeurs mesurées			
A	T1				
A	T2				
A	T3				
B	T0				
B	T1				
B	T2				
B	T3				
C	T1				
...	...				

CTA (De Cáceres *et al.*, 2019)

A petri dish containing a diverse community of aquatic organisms, including various stages of insect larvae, small crustaceans, and worms, illustrating a regional community dynamic.

Y-a-t-il une dynamique des communautés à l'échelle régionale ?

Intertidal bare

A top-down view of a clear glass petri dish containing a diverse community of small aquatic organisms, likely from a freshwater ecosystem. The organisms are densely packed and include various species such as copepods, rotifers, and small crustaceans, all appearing in different stages of development. The background is a plain, light-colored surface.

Les dynamiques des communautés dépendent-elles de l'habitat ?

Non centrées

Centrées

Subtidal
Habitats Biogénique vs Nu

10 % de la variance des trajectoires peut être attribuée au type d'habitat

→ Les dynamiques des communautés sont influencées par l'habitat

A petri dish containing a diverse community of aquatic organisms, including various species of rotifers, nematodes, and other small invertebrates, used as a model for studying community trajectories.

Les trajectoires des communautés sont-elles liées aux trajectoires des variables environnementales ?

Renseigne sur la variabilité des formes / tailles / directions des trajectoires au sein d'un habitat

Habitats	dBDtot		RV DT
	1
0.83	0.66	0.82, NS (n = 8)
0.77	0.56	0.85, NS (n = 7)
0.99	1	0.92, NS (n = 5)

Similarité entre les trajectoires taxonomiques et environnementales

Habitats	dBDtot		RV DT
	1	0.70	0.73, NS (n = 6)
0.83	0.66	0.82, NS (n = 8)
0.77	0.56	0.85, NS (n = 7)
0.99	1	0.92, NS (n = 5)

Un forte variabilité dans les dynamiques environnementales

Des formes de trajectoires de communautés + variables entre les sites

Les sites
présentent des
trajectoires
environnementales
les plus variables

Habitats	dBDtot		RV DT
	1	0.70	0.73, NS (n = 6)
0.83	0.66	0.82, NS (n = 8)
0.77	0.56	0.85, NS (n = 7)
0.99	1	0.92, NS (n = 5)

Pourtant les
dynamiques des
sites ne sont
pas les plus
hétérogènes

Habitats	dBDtot		RV DT
	1	0.70	0.73, NS (n = 6)
0.83	0.66	0.82, NS (n = 8)
0.77	0.56	0.85, NS (n = 7)
0.99	1	0.92, NS (n = 5)

Une similarité dans les trajectoires environnementales traduit une similarité dans les trajectoires des taxons

Habitats	dBDtot		RV DT
	1	0.70	0.73, NS (n = 6)
0.83	0.66	0.82, NS (n = 8)
0.77	0.56	0.85, NS (n = 7)
0.99	1	0.92, NS (n = 5)

Les trajectoires de l'habitat Maerl sont moins corrélées aux trajectoires environnementales

CONCLUSIONS

Y-a-t-il une dynamique des communautés à l'échelle régionale ?

- Pas de dynamique claire
- Trajectoires globalement non-directionnelles

Les dynamiques dépendent-elles de l'habitat ?

→ Trajectoires d'un même habitat sont + similaires entre elles qu'entre un habitat nu et biogénique pour un même étagement

CONCLUSIONS

Les trajectoires des communautés sont elles liées aux trajectoires des variables environnementales ?

→ Habitats de la zone subtidale + habitats biogéniques tamponnent l'effet des variations de l'environnement sur la dynamique des communautés

La méthode des trajectoires est-elle applicable sur des jeux de données d'observation du benthos ?

→ Oui mais nombre d'observations se réduit lorsque l'on s'intéresse aux trajectoires

Intertidal bare

- Sites
- Arcouest
 - Baie du Mont Saint-Michel
 - Callot
 - Erdeven
 - Gavres

Intertidal biogenic

- Sites
- Arcouest
 - Arradon
 - Callot
 - Molene
 - Roscanvel
 - Saint-Malo
 - Sainte-Marguerite

Subtidal bare

- Sites
- Baie de Douarnenez Nord
 - Concarneau
 - Lannion
 - Pierre Noire
 - Quiberon
 - Rade de Brest - Larmor
 - Saint-Brieuc
 - Vilaine Cote

Subtidal biogenic

- Sites
- Baie de Saint-Brieuc
 - Belle-ile
 - Camaret
 - Molene
 - Morlaix
 - Trevignon

- Sites
- Arcouest
 - Baie du Mont Saint-Michel
 - Callot
 - Erdeven
 - Gavres

- Sites
- Arcouest
 - Arradon
 - Callot
 - Molene
 - Roscanvel
 - Saint-Malo
 - Sainte-Marguerite

- Sites
- Baie de Douarnenez Nord
 - Concarneau
 - Lannion
 - Pierre Noire
 - Quiberon
 - Rade de Brest - Larmor
 - Saint-Brieuc
 - Vilaine Cote

- Sites
- Baie de Saint-Brieuc
 - Belle-ile
 - Camaret
 - Molene
 - Morlaix
 - Trevignon

Intertidal bare

Intertidal bare

Sites

- Arcouest
- Baie du Mont Saint-Miche
- Callot
- Erdeven
- Gavres

Reordered dendrogram from hclust(d = DT.sub.raw)

14 sites
2 clusters

Nu

Biogénique

Intertidal

Nu

Biogénique

Subtidal

Nu

Biogénique

Diversité spécifique --
+ Influencé par les les conditions environnementales

Diversité spécifique ++
Diversité fonctionnelle ++
Ressources disponibles ++
Multiplicité de niches ++
Atténuation des évènements extrêmes

Soumis à des stress plus fréquents sur de courtes périodes de temps

Réponse plus *lente* aux changements environnementaux

Trajectoires hypothétiques d'après Matthews *et al.*, 2013 et Lamothe *et al.*, 2019

Non directionnelle - Graduelle

Directionnelle – Graduelle

Résilience – Graduelle

Non directionnelle –Saltatoire

Directionnelle- Saltatoire

Résilience – Saltatoire

Intertidal

	Df	SumsOfSqs	MeanSqs	F.Model	R2	Pr(>F)
theme	1	0.19856	0.19856	1.1153	0.10034	0.0462 *
Residuals	10	1.78038	0.17804		0.89966	
Total	11	1.97894			1.00000	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

10 % de la variance des trajectoires peut être liée au type d'habitat -> Les dynamiques des communautés sont influencées par l'habitat

	Df	SumsOfSqs	MeanSqs	F.Model	R2	Pr(>F)
theme	1	0.22783	0.22783	1.2276	0.09281	0.001 ***
Residuals	12	2.22704	0.18559		0.90719	
Total	13	2.45487			1.00000	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Subtidal